

Informazioni e consenso per l'inserimento di un catetere peritoneale permanente tunnelizzato

(per il drenaggio temporaneo in casa)

Perché avviene l'inserimento di un catetere?

È da un periodo di tempo che si potrebbe aver fatto pensieri con una malattia degli organi interni. Un sintomo concomitante è l'accumulo di liquidi nella cavità addominale (ascite), che può ostacolare gravemente le attività quotidiane (sensazione di sazietà, perdita di appetito, vertigini, mancanza di respiro). Per alleviare i sintomi, questo liquido deve essere forato di tanto in tanto in ospedale. Al posto delle punzioni ricorrenti, si deve ora inserire un catetere peritoneale permanente tunnelizzato. Questo catetere consente di drenare il fluido da soli a casa, temporaneamente e secondo necessità. I disturbi associati all'accumulo di fluidi sono ridotti e possono essere controllati. Per rendere questa procedura facile e sicura per lei, sarete visitati e formati a casa da uno specialista di prodotti dell'azienda.

Il catetere permette una grande libertà di movimento, poiché un sistema di drenaggio deve essere collegato solo per 10 - 30 minuti a seconda delle necessità. Se dopo alcune settimane non si accumula più liquido, il catetere peritoneale permanente tunnelizzato può essere rimosso nuovamente sotto anestesia locale.


Come funziona un inserimento del catetere?

La procedura non è significativamente diversa da una puntura pleurica. La procedura è solitamente preceduta da un'infusione nel braccio. Con l'aiuto di un'ecografia o di una radiografia si determina il sito adatto per l'inserimento del catetere. La procedura può essere eseguita in regime ambulatoriale o con una breve degenza. La pelle e i muscoli vengono resi insensibili da un anestetico locale e, se necessario, viene somministrato un leggero sonnifero.

Il medico fa una puntura e due piccole incisioni ad una distanza di 4-7 cm. Posiziona il catetere sotto la pelle e lo inserisce nella cavità toracica. Il medico sutura il sito della puntura e il catetere sulla pelle nel sito di uscita del catetere.

All'estremità visibile c'è una valvola di sicurezza alla quale verrà collegato un sistema di drenaggio, ad esempio una bottiglia a vuoto, per drenare il fluido dal corpo.

Un leggero dolore, nel punto in cui il catetere è stato inserito, può essere possibile 1-3 giorni dopo l'intervento. Il catetere è sottile, morbido e flessibile ed è fissato con una benda non visibile sotto i vestiti.



Quali sono i rischi associati agli inserimenti di cateteri?

Il tasso di complicazione dell'inserimento del catetere è basso e comprende Ematoma locale della pelle o del muscolo e lieve emorragia nel punto di iniezione. Un'emorragia grave è rara.

Scarico della secrezione della ferita o dell'ascite dai siti di puntura (raro)

Lesione dell'intestino (perforazione) (molto rara)

Le infezioni sono rare (possono essere trattate con antibiotici, in caso di infezioni più gravi può essere necessaria la rimozione del catetere)

Nel caso peggiore (ad es. emorragia che non può essere fermata) può essere necessaria un'operazione. (molto raro)

Possibilità alternative di trattamento:

Forature ripetute. Tuttavia, le complicazioni di cui sopra possono verificarsi anche in caso di puntura dell'ascite.

Possibilità alternative di trattamento:

Forature ripetute. Tuttavia, le complicazioni di cui sopra possono verificarsi anche in caso di punzione dell'ascite.

Comportamento dopo l'operazione:

non guidare un veicolo il giorno dell'operazione

sintomi particolari (dolori addominali, febbre/ brividi) richiedono una consultazione medica immediata, se necessario direttamente nel reparto di emergenza

Subito dopo l'inserimento del catetere, il medico curante o un'infermiera contatta la ewimed Switzerland AG per fissare un appuntamento per la formazione a casa. Lo specialista di prodotti della ewimed Switzerland AG spiegherà in dettaglio come eseguire il drenaggio e il cambio della medicazione e consegnerà i relativi documenti di formazione. I set di drenaggio sono elencati nell'elenco MiGeL e sono in parte pagati dall'assicurazione di base della cassa malati. I set di drenaggio vengono consegnati a casa vostra senza spese di spedizione.

Io, il sottoscritto paziente, sono stato informato dal medico prima dell'intervento in una conversazione sulla diagnosi, il tipo, lo scopo e l'andamento della procedura e del trattamento sopra descritti in modo comprensibile e sono stato in grado di sollevare i miei problemi particolari. Sono stato anche informato delle possibili conseguenze nel periodo successivo alla procedura.

Confermo di aver menzionato tutti i miei disturbi noti, le irregolarità e le reazioni particolari (ad es. allergie, tendenza al sanguinamento o ai crampi, ecc.

.....
.....

Dopo chiare spiegazioni, acconsento alla procedura e al trattamento proposti. Il mio consenso si estende anche a qualsiasi estensione o modifica risultante dal corso intraoperatorio o dai risultati.

Luogo / data / ora

Firma del paziente

Firma del medico

Fonte: opuscolo informativo di ewimed Switzerland AG